



НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ДИЗЕСТЕЗИИ И ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПЛАТИНЕ

Диспноэ	Ларингофарингеальная дизестезия Гиперчувствительность к платине:	Есть Есть
Бронхоспазм	Ларингофарингеальная дизестезия Гиперчувствительность к платине	Нет Есть
Ларингоспазм	Ларингофарингеальная дизестезия Гиперчувствительность к платине	Нет Есть
Беспокойство/ тревога	Ларингофарингеальная дизестезия Гиперчувствительность к платине	Есть Есть
Сатурация кислорода	Ларингофарингеальная дизестезия Гиперчувствительность к платине	Нормальная Сниженная
Затруднение глотания	Ларингофарингеальная дизестезия Гиперчувствительность к платине	Есть (потеря чувствительности) Нет
Зуд	Ларингофарингеальная дизестезия Гиперчувствительность к платине	Нет Есть
Симптомы, индуцированные холодом	Есть	Нет
Симптомы, индуцированные холодом	Ларингофарингеальная дизестезия Гиперчувствительность к платине	Есть Нет
Давление	Ларингофарингеальная дизестезия Гиперчувствительность к платине	Нормальное/ повышенное Нормальное/ сниженное
Лечение	Ларингофарингеальная дизестезия Гиперчувствительность к платине	Транквилизаторы (анксиолитики); наблюдение до исчезновения симптомов или по усмотрению врача Гиперчувствительность к платине: кислород, ГКС, адреналин, бронходилататоры; Если необходимо: жидкости и вазопрессоры